

## Combi

### Viagra met poppers

Poppers zijn drugs die nitraten bevatten. Nitraten zijn stoffen die hetzelfde effect op de bloeddruk hebben als Viagra. Gecombineerd gebruik van Viagra en poppers kan leiden tot extreem lage bloeddruk, beroerte, hartaanval en zelfs de dood.

### Poppers met GHB

De combinatie poppers met GHB is af te raden, omdat poppers veranderingen geven in de opnamecapaciteit van zuurstof in de rode bloedcellen. De combinatie poppers met GHB is een extra belastend voor de zuurstofopname in het bloed, die verhoogde risico's geven op je ademhaling.

### Viagra met XTC/speed/coke

Een andere bekende combinatie is XTC en Viagra (sextasy). Deze combinatie is populair, omdat Viagra de tijdelijke impotentie (veroorzaakt door XTC) tegen kan gaan. Gecombineerd gebruik van Viagra en XTC kan hartklachten veroorzaken. Dit heeft te maken met het feit dat XTC de bloeddruk verhoogt en het hartritme versnelt, terwijl Viagra juist het tegenovergestelde effect heeft. Tevens kunnen beide stoffen elkaars afbraak in de lever beïnvloeden. Dit kan leiden tot gevaarlijk hoge concentraties van zowel XTC als Viagra in het bloed. Naast de directe gevaren voor de gezondheid moet ook rekening gehouden worden met een indirect gevaar, namelijk de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die XTC gebruiken in combinatie met Viagra eerder onveilige

seks hebben. Dit komt vooral doordat XTC remmingen weghaalt en het vermogen tot helder nadenken over de mogelijke gevolgen van onveilige seks verminderd. Ook combinaties met andere stimulantia zoals speed en coke geven een extra belasting op je hart- en bloedvatenstelsel.

## Unity tips

- Gebruik geen drugs als je medicijnen neemt.
- Combineer drugs nooit met alcohol.
- Gebruik geen poppers als je snel flauwvalt.
- Wees voorzichtig met de dosering: kleine mensen en vrouwen hebben vaak een lagere dosis nodig. Begin altijd eerst met een lage dosering.
- Bedenk dat je met sommige middelen het effect van een ander middel lijkt uit te schakelen.
- Gebruik niet als je je niet goed voelt en je psychische- en/of lichamelijke problemen hebt.
- Neem geen deel aan het verkeer.
- Vrij veilig.

**'Think for yourself, care about others'**



**Meer info en onze party agenda:**  
[www.unity.nl](http://www.unity.nl)



**Drugs testen:**  
[www.drugs-test.nl](http://www.drugs-test.nl)

# Poppers Viagra

## Poppers

Poppers, ofwel amylnitriet of butylnitriet, is een gelige brandbare vloeistof die zeer snel verdampt. Ze worden meestal in kleine flesjes op de markt gebracht. Het middel komt oorspronkelijk uit de geneeskunde. Het werd voorgeschreven aan mensen met angina pectoris, een hartkwaal waarbij de hartspier onvoldoende bloed krijgt en er hevige kramp ontstaat. Het zat vroeger in capsules die bij het openen een 'poppend' geluid maakten; vandaar de naam 'poppers'. Het middel wordt gebruikt door iets van de vloeistof op een zakdoek te doen en daarna de damp op te snuiven ofwel door rechtstreeks aan het flesje te ruiken. De effecten beginnen al na 10 seconden en duren slechts een minuut. Het middel irriteert de huid en de zakdoek mag dus nooit in direct contact komen met huid of slijmvliezen

## Effecten

Effecten zijn altijd afhankelijk van je geestelijke en lichamelijke gesteldheid (set) en de situatie/omgeving (setting) waarin je gebruikt. Gebruikers ervaren een mild, kortstondig, gelukkig gevoel. Je voelt je plotseling zeer ontspannen, slap en duizelig en een warm gevoel stijgt naar je hoofd. Ook ervaar je een sterke geur. Het middel veroorzaakt een verslaving van de (gladde) spieren en de vaatwanden. Dat geldt ook voor de kringspier van de anus. Dit is een reden waarom

poppers in homokringen tijdens het vrijen worden gebruikt. De bloedvaten verwijden zich waardoor de bloeddruk daalt. Hierdoor word je slap en duizelig en kun je flauwvallen. Het hart gaat sneller kloppen met als gevolg hartkloppingen en (bonkende) hoofdpijn.

### Positieve effecten

- versterkt lustgevoelens
- maakt orgasme heftiger
- ontspant
- euforische, gelukzalige stemming

### Negatieve effecten

- verlaagd de bloeddruk
- duizeligheid
- misselijkheid
- hoofdpijn
- slap gevoel in de spieren
- bewustzijnsverlies

## Risico's

Na gebruik kunnen vervelende effecten optreden. Je kunt een knallende hoofdpijn krijgen, misselijk worden of last krijgen van duizeligheid en flauwvallen. Ook kunnen hevige hartkloppingen ontstaan. Bloedarmoede is een belangrijk risico van gebruik van poppers. Doordat poppers de druk achter de oogbol verhogen, kunnen gezichtsstoornissen ontstaan. Bij sporadisch en beperkt gebruik door gezonde personen zijn de risico's gering. Bij langdurig en frequent gebruik zijn er wel degelijk risico's aanwezig, vooral voor de lichamelijke gezondheid. Mensen die de neiging hebben snel flauw te vallen, moeten geen poppers gebruiken. Poppers zijn brandbaar en het is

dus oppassen geblazen met brandende sigaretten en aanstekers. Poppers mogen alleen gesnoven worden.

## Verslaving, wet en verkeer

Poppers zijn niet echt verslavend. Wel wen je aan poppers en heb je dus steeds meer nodig om het effect te voelen. Dat kan aanleiding geven tot frequent gebruik, waardoor de risico's toenemen. Onthoudingsverschijnselen treden niet op. Wel kun je van het middel psychisch afhankelijk worden, bijvoorbeeld als je denkt dat je alleen met poppers seks kunt hebben. Poppers waren voor augustus 2001 vrij verkrijgbaar. Een popper was tot die tijd een niet geregistreerd geneesmiddel. Smartshops mochten poppers verkopen. De Europese Unie besloot in 2001 dat poppers te gevaarlijk waren om zomaar te verkopen. Het Ministerie van Volksgezondheid verbood het middel en sinds die tijd vallen ze onder de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG). Dit houdt in dat poppers alleen op recept verstrekt mogen worden. De Keuringsdienst van Waren controleert het regeringsbesluit. Op het zonder vergunning verkopen kan een boete of zelfs een gevangenisstraf volgen. Poppers en deelnemen aan het verkeer gaan niet samen. Je wordt slap in je spieren, bent er niet bij met je aandacht of kunt zelfs flauwvallen. Het besturen van een voertuig onder invloed van poppers is verboden.

## Viagra

Viagra is een middel bestemd voor de behandeling van erectiestoornissen. De werkzame stof in Viagra (sildenafil citraat) zorgt voor een verwijding van de

bloedvaten en geeft daardoor een verlaging van de bloeddruk. Hierdoor kan de erectie tot stand komen. Er is weinig onderzoek gedaan naar de risico's van Viagra wanneer je dit niet voorgeschreven hebt gekregen van een arts. Overleg met je arts of je dit middel kan gebruiken. Viagra is in blauwe pilvorm op de markt van de fabrikant Pfizer. Er zijn veel neppillen op de markt met risico's. Kijk voor meer informatie op [www.neppillen.nl](http://www.neppillen.nl) Viagra werkt ongeveer 25 minuten na inname en is 4 tot 5 uur werkzaam. Dat wil niet zeggen dat de erectie zolang aanhoudt, maar dat je bij seksuele prikkeling in die tijd een erectie kan krijgen. Viagra verhoogd de zin in seks niet en is slechts bedoeld om een erectie tot stand te brengen wanneer je reeds opgewonden bent. Het is een fabel dat Viagra ervoor kan zorgen dat je een hinderlijke, langdurige erectie kan krijgen.

## Verslaving, wet en verkeer

Viagra werkt bloeddrukverlagend en heeft geen stimulerende, kalmerende of hallucinerende werking en is dus niet verslavend. Viagra valt ook onder de WOG en is alleen te verkrijgen op doktersrecept. Productie, handel en bezit zonder recept is verboden. Deelnemen aan het verkeer met Viagra is niet gevaarlijk, mits NIET gecombineerd met andere middelen die af te raden zijn in het verkeer zoals alcohol, XTC, etc.